# Acer x freemanii 'Jeffersred' Freemanii-Ahorn



#### **SAISONFARBEN**

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

#### **PFLANZENTYPEN**

**Baumarten**: hochstämmige Bäume, Stammbüsche, mehrstämmige Bäume, Klima-Bäume, Schattenbäume | **Formbäume mit Stamm**: Kasten/Block, mehrstämmige Schirmform

## VERWENDUNG

Ort: Straße, Allee, Platz, Park, Grünstreifen, Töpfe / Container, Dachgarten, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen | Bodenversiegelung: keine, offen, dicht | Bepflanzungskonzepte: Klimabepflanzung, Präriebepflanzung

#### **EIGENSCHAFTEN**

Kronenform: breit, eirund | Kronenstruktur: geschlossen | Höhe: 12 - 17 m | Breite: 9 - 12 m | Winterhärtezone: 4A - 9B

## **STANDORT**

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind | Bodentypen: Löss, Ton, Torfboden, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden, alle Bodentypen | Nährstoffgehalt: einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | Bodenfeuchtigkeit: trocken, feucht, nass | Lichtbedürfnis: Sonne, Halbschatten | pH-Wert: sauer, neutral, basisch | Wirtspflanze/Futterpflanze: Bienen, Schmetterlinge | Extreme Umgebungen: verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt Hitze

# PLANTKENMERKEN

Blüten: Blütenrispen, diskret | Blütenfarbe: Gelbgrün | Blütezeit: März - April | Blattfarbe: Bronze austreibend, helles Grün, Unterseite graugrün | Blatt: laubabwerfend, handförmig, dick, gegenüberstehend, doppelt gesägt, gelappt | Herbstfärbung: Rotorange, Scharlach | Frucht: selten Früchte, geflügelt | Fruchtfarbe: Gelbbraun, Grün | Rindenfarbe: Graubraun | Rinden: furchig | Zweigefarbe: Rotbraun | Zweige: gestreift, mit Lentizellen | Wurzelsystem: tiefgehend, flach, feine Wurzeln



