Hovenia dulcis
Japanische Rosinenbaum, Quaffbirne, Japanische Mahagoni



PFLANZENTYPEN
Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume, charakteristische Bäume, Solitärgehölze

VERWENDUNG
Ort: Park, Grünstreifen, großer Garten, Friedhof | **Bodenversiegelung**: keine | **Bepflanzungskonzepte**: essbare Waldgarten, städtische Bepflanzung

EIGENSCHAFTEN
Kronenform: rund, vasenförmig | **Kronenstruktur**: halboffen | **Höhe**: 9 - 12 m | **Breite**: 6 - 9 m | **Winterhärtezone**: 6A - 9B

STANDORT
Windfestigkeit: verträgt wenig Wind | **Bodentypen**: Löss, Ton, Torfboden, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden, alle Bodentypen | **Nährstoffgehalt**: einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: trocken, feucht | **Lichtbedürfnis**: Sonne, Halbschatten | **pH-Wert**: sauer, neutral, basisch | **Wirtspflanze/Futterpflanze**: Bienen, Schmetterlinge, Nektarwert 3, Pollenwert 5 | **Extreme Umgebungen**: verträgt Trockenheit, Kuriosität

PLANTKENMERKEN
Blüten: Rispen, auffällig, aufrecht, blumen duftend | **Blütenfarbe**: Rahmweiß | **Blütezeit**: Juni - August | **Blattfarbe**: Dunkelgrün, Unterseite hellgrün | **Blatt**: laubabwerfend, oval, glänzend, rau, gesägt | **Herbstfärbung**: Gelb | **Frucht**: auffallend, essbar, Nuss | **Fruchtfarbe**: Graubraun, Schwarz | **Rindenfarbe**: Rotbraun, Grauschwarz | **Rinden**: abblättern, leicht furchig | **Zweigefarbe**: Rotbraun, Braunviolett | **Zweige**: kahl, mit Lentizellen, horizontaler Aststand, fein verzweigt, lange Triebe | **Wurzelsystem**: stark verzweigt

EBBEN trees since 1862
TreeEbb