

Tsuga heterophylla
Westamerikanische Hemlocktanne, Westliche Hemlock

PFLANZENTYPEN
Baumarten: hochstämmige Bäume, Stammbüsche, Nadelgehölze/Koniferen | **Formbäume mit Stamm**: mehrstämmige Schirmform

VERWENDUNG
Ort: Park, großer Garten | **Bodenversiegelung**: keine | **Bepflanzungskonzepte**: schattentolerant

EIGENSCHAFTEN
Kronenform: schmal, pyramidal | **Kronenstruktur**: geschlossen | **Höhe**: 15 - 30 m | **Breite**: 8 - 12 m | **Winterhärtezone**: 6B - 8A

STANDORT
Windfestigkeit: verträgt wenig Wind | **Bodentypen**: Löss, Ton, Torfboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt**: nährstoffarm, einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: feucht, nass | **Lichtbedürfnis**: Halbschatten, Schatten | **pH-Wert**: sauer, neutral

PLANTKENMERKEN
Blüten: diskret | **Blütenfarbe**: Gelbgrün | **Blütezeit**: April - Mai | **Blattfarbe**: Dunkelgrün, Hellgrün austreibend, Unterseite Weißgrau | **Blatt**: immergrün, Nadeln oder Schuppen, kurze Nadeln | **Frucht**: diskret, klein, Kegel | **Fruchtfarbe**: Braun | **Rindenfarbe**: Graubraun | **Rinden**: abblättern, furchig | **Zweigefarbe**: Braungrün | **Zweige**: flaumig behaart, horizontaler Aststand, hängend | **Wurzelsystem**: flach, ausgedehnt

EBBEN trees since 1862
TreeEbb