

Acer buergerianum

Érable trident



COULEURS SAISONNIÈRES



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres multi-troncs, arbres d'ombrage, arbres caractéristiques | **Tige formée:** multi-troncs forme parasol

UTILISATION

Lieu: avenue, place, parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle | **Pavage:** sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation:** plantation urbaine

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: ronde, ellipse, ellipse étroite, ellipse large | **Structure du houppier:** semi-ouverte | **hauteur:** 8 - 15 m | **largeur:** 6 - 10 m | **zone de rusticité:** 6B - 9A

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère moyennement le vent, tolère moyennement le vent marin | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques:** pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol:** sec, légèrement humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles | **Environnements extrêmes:** tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

PLANTKENMERKEN

Fleurs: grappe, corymbe, debout | **Couleur des fleurs:** jaune-vert | **Floraison:** avril - mai | **Couleur des feuilles:** bourgeonnant en bronze, vert, dessous gris-vert | **Feuilles:** à feuilles caduques, brillante, lobée | **Couleur automnale:** jaune-orange, orange-rouge, rouge-violet | **Fruits:** frappants, ailés, petits | **Couleur des fruits:** marron-vert | **Couleur du tronc:** orange, gris-marron | **Tronc:** en rubans | **Couleur des rameaux:** gris-marron, vert | **Rameaux:** nu, avec lenticelles | **Système racinaire:** superficiel, finement ramifié