Alnus subcordata 'Oberon'
Aulne du Caucase 'Oberon'

TYPES DE PLANTES
Types d'arbres: arbres haute tige

UTILISATION
Lieu: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, paysage, coupe-vent, région côtière | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation paysagère

PROPRIéTéS
Forme de la couronne: pyramidale étroite | **Structure du houppier**: semi-ouverte | **hauteur**: 12 - 20 m | **largeur**: 5 - 7 m | **zone de rusticité**: 6A - 8B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN
Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques**: pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol**: très sec, sec, légèrement humide, humide | **Exposition**: soleil, mi-ombre | **pH**: acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière**: oiseaux | **Environnements extrêmes**: tolère le sel de déneigement

PLANTKENMERKEN
Fleurs: chatons, frappante, pendante, grande | **Couleur des fleurs**: vert | **Floraison**: janvier - février | **Couleur des feuilles**: bourgeonnant en violet, vert, dessous gris-vert | **Feuilles**: à feuilles caduques, obovale, ovale, brillante, serretée, doublement serretée, Fixatrices d'azote | **Fruits**: frappants, cône | **Couleur des fruits**: noir | **Couleur du tronc**: gris-marron | **Tronc**: glabre, plus tard rugueuse | **Couleur des ramaux**: marron-violet | **Rameaux**: pendante | **Système racinaire**: superficiel, finement ramifié