

Alnus subcordata 'Oberon'

Aulne du Caucase 'Oberon'



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, paysage, coupe-vent, région côtière | **Pavage:** sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation:** Végétation paysagère

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: pyramidale étroite | **Structure du houppier:** semi-ouverte | **hauteur:** 12 - 20 m | **largeur:** 5 - 7 m | **zone de rusticité:** 6A - 8B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol:** très sec, sec, légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière:** oiseaux | **Environnements extrêmes:** tolère le sel de déneigement

PLANTKENMERKEN

Fleurs: chatons, frappante, pendante, grande | **Couleur des fleurs:** vert | **Floraison:** janvier - février | **Couleur des feuilles:** bourgeonnant en violet, vert, dessous gris-vert | **Feuilles:** à feuilles caduques, obovale, ovale, brillante, serretée, doublement serretée, Fixatrices d'azote | **Fruits:** frappants, cône | **Couleur des fruits:** noir | **Couleur du tronc:** gris-marron | **Tronc:** glabre, plus tard rugueuse | **Couleur des rameaux:** marron-violet | **Rameaux:** pendante | **Système racinaire:** superficiel, finement ramifié

