Alnus x *spaethii*
Aulne de Späth

COULEURS SAISONNIèRES

jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres multi-troncs, arbres de climat, arbres à grimper, arbres d'ombrage | **Tige formée**: têtard

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle, paysage, coupe-vent, région côtière | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation de climat, Végétation paysagère, Végétation solide, Végétation de prairie

PROPRIéTéS

Forme de la couronne: pyramidale large | **Structure du houppier**: semi-ouverte | **hauteur**: 12 - 20 m | **largeur**: 8 - 12 m | **zone de rusticité**: 6A - 9B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques**: pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol**: sec, légèrement humide, humide | **Exposition**: soleil, mi-ombre | **pH**: acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière**: oiseaux | **Environnements extrêmes**: tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

PLANTKENMERKEN

Fleurs: chatons, frappante, pendante, grande | **Couleur des fleurs**: jaune-marron | **Floraison**: janvier - février | **Couleur des feuilles**: bourgeonnant en rouge-violet, vert foncé | **Feuilles**: à feuilles caduques, ovale, opposée, tannée, polie mate, dessous poilu, serretée, Fixatrices d'azote | **Couleur automnale**: violet | **Fruits**: frappants, cône | **Couleur des fruits**: noir | **Couleur du tronc**: gris-marron | **Tronc**: cannelée | **Couleur des ramaux**: gris-marron | **Rameaux**: nu, avec lenticelles | **Système racinaire**: superficiel, fortement ramifié, soulèvement des racines

EBBEN trees since 1862

TreeEbb