

## *Lindera benzoin*

Laurier faux-benjoin, Benjoin, Arbre à fièvre, Arbre à épice, Benjoin odoriférant, Laurier benzoin



### TYPES DE PLANTES

**Types d'arbres:** arbres multi-troncs, arbustes solitaires | **Tige formée:** multi-troncs forme parasol

### UTILISATION

**Lieu:** parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, grand jardin, petit jardin, patio, cimetière, oued | **Pavage:** sans

### PROPRIÉTÉS

**Forme de la couronne:** ronde | **Structure du houppier:** fermée | **hauteur:** 2 - 5 m | **largeur:** 2 - 5 m | **zone de rusticité:** 5B - 9B

### CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

**Vent:** tolère moyennement le vent | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol:** sec, légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre, ombre | **pH:** acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, oiseaux | **Environnements extrêmes:** tolère la sécheresse

### PLANTKENMERKEN

**Fleurs:** grappe, frappante, petite | **Couleur des fleurs:** jaune | **Floraison:** avril - mai | **Couleur des feuilles:** vert, dessous gris-vert | **Feuilles:** à feuilles caduques, obovale, ovale, parfumée avec contusion | **Couleur automnale:** jaune d'or | **Fruits:** frappants, petits, baie, drupe | **Couleur des fruits:** rouge | **Couleur du tronc:** gris-marron | **Tronc:** glabre, plus tard rugueuse | **Couleur des rameaux:** gris-marron | **Rameaux:** nu, avec lenticelles, ramification verticale, ramification fine | **Système racinaire:** superficiel, étendu, finement ramifié, grande quantité de radicelles,

