

Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson'

Copalme d'Amérique 'Andrew Hewson', Liquidambar 'Andrew Hewson'



Le *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Hewson' (copalme d'Amérique 'Andrew Hewson', Liquidambar 'Andrew Hewson', synonyme *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Henson') est une sélection qui, en termes de forme de croissance, de feuillage et de branches, présente de nombreuses similitudes avec son espèce. Le cultivar est apparu avant 1990, mais son origine et l'explication de son nom sont et restent inconnues. Le copalme d'Amérique 'Andrew Hewson' est un arbre à croissance rapide et robuste, mais avec une hauteur finale de quinze à vingt mètres, il reste un rien plus petit par rapport à l'espèce. Les jeunes spécimens ont une forme pyramidale étroite avec une branche axiale continue, mais lorsque la sélection 'Andrew Hewson' vieillit, l'arbre s'affaisse quelque peu et la couronne s'élargit et devient semi-ouverte et en forme d'ellipse, entre huit et douze mètres de large.

Le copalme d'Amérique 'Andrew Hewson' a une apparence plus élégante que l'espèce, ce qui est dû à ses feuilles plus grandes et plus profondément échancrées. Au printemps, les feuilles lobées sont de couleur bronze lorsqu'elles éclosent et virent au vert foncé en été. Ce cultivar présente également une coloration automnale panachée orange-rouge à rouge-violet, fiable et spectaculaire, que l'on peut admirer tôt en automne. Plus l'habitat de l'arbre est humide, plus la couleur d'automne se dirige vers le spectre des couleurs rouge-violet. Fin avril, début mai, l'arbre fleurit discrètement et se pare d'épis de fleurs jaune-vert. Le *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Hewson' présente, tout comme le *Liquidambar styraciflua*, de belles excroissances de liège sur les branches et les rameaux.

Le *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Hewson' s'utilisera parfaitement dans des rues ou avenues plus larges. Mais également dans de grands jardins ou parcs, le cultivar brillera grâce à ses magnifiques couleurs d'automne. À l'instar de tous les copalmes d'Amérique, la sélection 'Andrew Hewson' est quelque peu sensible au vent et un habitat trop venteux risque d'entraîner la rupture de branches. Pour une croissance et une coloration automnale optimales, prévoyez un endroit abrité et ensoleillé, dans un sol raisonnablement riche en humus, acide à neutre, pour le *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Hewson'.

TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres d'ombrage

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, place, terrain de stationnement, parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, grand jardin, cimetière | **Pavage:** sans, ouvert, fermé

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: ellipse large, pyramidale étroite | **Structure du houppier:** semi-ouverte | **hauteur:** 15 - 20 m | **largeur:** 8 - 12 m | **zone de rusticité:** 5B - 10B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère moyennement le vent | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques:** normal, riche en humus | **Humidité du sol:** légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil | **pH:** acide, neutre | **Environnements extrêmes:** supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN

Fleurs: épi, capitule, discrète | **Couleur des fleurs:** jaune-vert | **Floraison:** avril - mai | **Couleur des feuilles:** bourgeonnant en bronze, vert foncé | **Feuilles:** à feuilles caduques, palmatilobée, parfumée avec contusion, disséquée, crénelée, lobée | **Couleur automnale:** orange-rouge, écarlate, rouge-violet | **Fruits:** peu de fruits, petits, capsule, petite noix épineuse | **Couleur des fruits:** marron | **Couleur du tronc:** gris | **Tronc:** cannelée | **Couleur des rameaux:** rouge-marron | **Rameaux:** subéreuse | **Système racinaire:** profond, étendu, racines charnues, racine pivotante