


Acer japonicum 'Aconitifolium'

klon japoński odm. Aconitifolium



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa wielopniowe, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, duży ogród, mały ogród, patio, cmentarz | **Chodnik:** brak | **Koncept nasadzeń:** tolerancja cienia

CECHY

Kształt korony: kulista | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 5 - 8 m | **Szerokość:** 4 - 5 m | **Strefa mrozoodporności:** 5B - 8B

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień żyzności:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.5)

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, baldachogrona, zwisające | **Kolor kwiatów:** czerwono-fioletowy | **Termin kwitnienia:** kwiecień - kwiecień | **Kolor liści:** ciemnozielony, spodem szarzielony | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, naprzeciwległe, lekko owłosione, głęboko powcinane (dissectum), piłkowane, wrębne | **Kolor jesienią:** żółtopomarańczowy, szkarłatny | **Owoce:** efektowne, skrzydlate, oszronione, torebki | **Kolor owoców:** czerwony | **Kolor kory:** szary | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** szarobrązowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** płytki



EBBEN
trees since 1862

TreeEbb