

Acer palmatum 'Bloodgood'

klon palmowy odm. Bloodgood



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa wielopniowe, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pojemniki, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak | **Koncept nasadzeń:** tolerancja cienia

CECHY

Kształt korony: szeroka odwrotnie jajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 4,5 - 6 m | **Szerokość:** 5 - 7 m | **Strefa mrozoodporności:** 6A - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień żyzności:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.8) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, wartość nektaru 1, wartość pyłku 1

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: baldachogrona, efektowne, zwisające, małe | **Kolor kwiatów:** czerwony | **Termin kwitnienia:** maj - czerwiec | **Kolor liści:** pączki czerwone, ciemno czerwono-fioletowy | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, naprzeciwległe, ząbkowane, wrębne | **Kolor jesienią:** ciemnoróżowy | **Owoce:** efektowne, skrzydlate, małe | **Kolor owoców:** czerwony | **Kolor kory:** brązowy | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** brązowo-fioletowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** płytki, kompaktowy, z dużą ilością włóśników, korzenie boczne