

Acer saccharinum 'Asplenifolium'

klon srebrzysty odm. Asplenifolium



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa dające cień

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: aleja, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wadi (odwadnianie poprzez drenaż i infiltrację) | **Chodnik:** brak, otwarty | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia miejskie

CECHY

Kształt korony: kulista, odwrotnie jajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 15 - 20 m | **Szerokość:** 12 - 18 m | **Strefa mrozoodporności:** 4A - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użynienia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.8) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 5, wartość pyłku 5 | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza, znosi krótkie podtopienia

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, niepozorne | **Kolor kwiatów:** jasnoczerwony, żółtozielony | **Termin kwitnienia:** marzec - marzec | **Kolor liści:** pączki brązowe, jaskrawozielony, spodem białoszary | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, głęboko powcinane (dissectum), piłkowane, wrębne | **Kolor jesienią:** żółty | **Owoce:** skrzydlate, torebki | **Kolor owoców:** żółto-brązowy, brązowozielony | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** bruzdowana | **Kolor pędów:** cynamonowo-brązowy | **Pędy:** nagie, z przetchlinkami | **System korzeniowy:** płytki, mocno rozgałęziony, korzenie boczne, korzenie wypychające powierzchnię