

Aesculus pavia 'Koehnei'

kasztanowiec krwisty odm. Koehnei



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa półpienne

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, mały ogród, patio | **Chodnik:** brak | **Koncept nasadzeń:** tolerancja cienia

CECHY


Kształt korony: kulista | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 2 - 3 m | **Szerokość:** 2 - 3 m | **Strefa mrozoodporności:** 6B - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły | **Ekstremalne warunki:** bez zarażeń chorobą krwawienia

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: wiechy, stojące | **Kolor kwiatów:** łososiowy | **Termin kwitnienia:** maj - czerwiec | **Kolor liści:** pączki brązowe, bladozielony | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, złożone | **Kolor jesienią:** złotożółty | **Owoce:** duże, w łupinie | **Kolor owoców:** brązowozielony | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** szarobrązowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** rozległy, korzenie boczne, zdrewniałe korzenie, korzeń palowy



EBBEN
trees since 1862

TreeEbb