

Amelanchier lamarckii
Świdośliwa amerykańska, Świdośliwa lamarcka



Amelanchier lamarckii (świdośliwa amerykańska) pochodzi pierwotnie z północnowschodniej części Ameryki Północnej. Ta odmiana zawdzięcza swoją nazwę francuskiemu biologowi i przyrodnikowi – Jean-Baptiste de Lamarck, który jako pierwszy opisał krzew w 1783 roku. W XIX w. sprowadzono drzewko do Europy i od tamtej pory rozpowszechniło się i jest bardzo często sadzone. Amelanchier tworzy z natury szeroko rosnący krzew, ale uprawia się je również jako parasolowate, wielopniowe drzewo lub jako małe, bądź średnie drzewo wysokopienne.

Od połowy kwietnia do początku maja świdośliwa okrywa się prawdziwym morzem białych, gwiaździstych kwiatów. W czasie kwitnienia drzewo wypuszcza brązowo-czerwone liście, później zmieniają one kolor na zielony o zielono-szarym spodzie. W okolicach lipca pojawiają się jadalne, niebiesko-fioletowe jagody o słodkim i soczystym smaku. Ptaki za nimi przepadają. Na jesieni liście spektakularnie zmieniają kolor na pomarańczowo-czerwony. Po opadnięciu liści *Amelanchier lamarckii* pokazuje swój charakterystyczny, ozdobny profil o szerokiej, drobno rozgałęzionej koronie o odwrotnie jajowatym kształcie.

Jest odporny na wiatr, bryzę i zanieczyszczenie powietrza, podobnie jak otwartą przestrzeń. Dlatego ta odmiana dobrze nadaje się na obszary miejskie. Ponadto jest to cenne drzewo dla stref ekologicznych, jako źródło pożywienia dla pszczół, motyli i ptaków. *Amelanchier lamarckii* powinien rosnąć na glebie próchniczej o lekko kwaśnym bądź obojętnym odczynie pH w słońcu, aby uzyskać najładniejsze kwiaty, najlepsze owoce i najciekawsze ubarwienie jesienią. Ta odmiana jest mniej odporna na mączniaka, powodującego trochę wcześniejsze przebarwienie i opad liści jesienią.

KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa charakterystyczne, drzewa owocowe, sadzonki leśne, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu**: wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: aleja, parking, park, pas zieleni, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wieś, obszar ekologiczny, obszar nadbrzeżny | **Chodnik**: brak, otwarty | **Koncept nasadzeń**: food forest, Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia krajobrazowe

CECHY

Kształt korony: szeroka odwrotnie jajowata | **Struktura korony**: półotwarta | **Wysokość**: 6 - 8 m | **Szerokość**: 6 - 8 m | **Strefa mrozoodporności**: 4A - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr, umiarkowanie odporne na nadmorski wiatr | **Gleba**: less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użynienia**: średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby**: wilgotna | **Stanowisko**: słoneczne | **Odczyn gleby**: kwaśny, obojętny | **Rośliny pożyteczne**: pszczoły, motyle, ptaki, ludzie, wartość nektaru 2, wartość pyłku 2 | **Ekstremalne warunki**: tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, gwiaździste, efektowne, stojące, małe, zapach kwiatowy | **Kolor kwiatów**: biały | **Termin kwitnienia**: kwiecień - maj | **Kolor liści**: pączki brązowe, zielony, spodem szarozielony | **Liście**: opadające zimą, jajowate, małe, naprzeciwległe, piłkowane | **Kolor jesienią**: pomarańczowoczerwony | **Owoce**: jadalne, małe, oszronione, jagody | **Kolor owoców**: niebieskofioletowy | **Kolor kory**: szarobrązowy | **Kora**: gładka | **Kolor pędów**: szarobrązowy | **Pędy**: nagie, poziomy wzór rozgałęzień, drobno rozgałęzione | **System korzeniowy**: płytki, rozległy, mocno rozgałęziony, korzenie boczne

EBBEN trees since 1862

TreeEbb