

Larix decidua
modrzew europejski



KOLORY SEZONOWE

jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

TYP NASADZEń

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa o pokroju naturalnym, drzewa wielopniowe, drzewa iglaste, sadzonki leśne | **Topiary na pniu**: wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: aleja, plac, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wieś, obszar nadbrzeżny | **Chodnik**: brak, otwarty | **Koncept nasadzeń**: Nasadzenia krajobrazowe

CECHY

Kształt korony: wąskopiramidalna | **Struktura korony**: otwarta | **Wysokość**: 25 - 45 m | **Szerokość**: 12 - 15 m | **Strefa mrozoodporności**: 4A - 7B

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr, odporne na nadmorski wiatr | **Gleba**: less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użynienia**: średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby**: wilgotna | **Stanowisko**: słoneczne | **Odczyn gleby**: kwaśny, obojętny | **Rośliny pożyteczne**: ptaki, małe ssaki

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: efektowne, stojące | **Kolor kwiatów**: różowoczerwony | **Termin kwitnienia**: kwiecień - kwiecień | **Kolor liści**: zielony | **Liście**: opadające zimą, krótkie igły | **Kolor jesienią**: żółtopomarańczowy | **Owoce**: małe, szyszki | **Kolor owoców**: czerwonobrązowy | **Kolor kory**: szarobrązowy | **Kora**: bruzdowana | **Kolor pędów**: żółtobrązowy | **Pędy**: nagie | **System korzeniowy**: głęboki

EBBEN trees since 1862

TreeEbb