


Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson'

ambrowiec balsamiczny odm. Andrew Hewson



Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson' (ambrowiec amerykański, odm. 'Andrew Hewson', synonim *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Henson') to odmiana, która pod względem pokroju, listowia i gałęzi wykazuje wiele podobieństw do gatunku. Kultywar powstał przed 1990 rokiem, ale jego pochodzenie i geneza nazwy pozostają nieznane. Ambrowiec amerykański 'Andrew Hewson' jest szybko rosnącym i mocnym drzewem, ale jego ostateczna wysokość, wynosząca od piętnastu do dwudziestu metrów, jest nieco mniejsza niż w przypadku gatunku. Młode egzemplarze mają wąski, piramidalny pokrój i wyprostowany pień główny, ale w miarę dojrzewania drzewo ma tendencję do opadania, a korona staje się półtwarda i przybiera kształt jajowaty, o szerokości od ośmiu do dwunastu metrów.

Ambrowiec amerykański 'Andrew Hewson' ma bardziej elegancki wygląd niż gatunek, co można przypisać większym, głębiej wciętym liściom. Wiosną pojawiają się brązowe, klapowane liście, które latem zmieniają barwę na ciemnozieloną. Odmiana ta wyróżnia się także wyjątkowo efektownymi, pomarańczowoczerwonymi do czerwono-fioletowymi barwami jesiennymi, które można podziwiać już na początku sezonu. Im wilgotniejsze miejsce uprawy drzewa, tym intensywniejsza jesienna czerwono-purpurowa barwa. Pod koniec kwietnia lub na początku maja drzewo wypuszcza niepozorne, żółtozielone pędy kwiatowe. Podobnie jak *Liquidambar styraciflua*, *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Hewson' ma wspaniałe korkowate pęknięcia na gałęziach i pędach.

Liquidambar styraciflua 'Andrew Hewson' jest doskonałym rozwiązaniem przy szerszych ulicach lub alejach. Odmiana ta stworzy również wspaniały pokaz intensywnych jesiennych kolorów w dużych ogrodach lub parkach. Podobnie jak inne ambrowce amerykańskie, odmiana 'Andrew Hewson' jest dość wrażliwa na wiatr, a zbyt ekspozycyjne stanowisko może być przyczyną łamania się gałęzi. Aby zapewnić optymalny wzrost i jesienne wybarwienie, *Liquidambar styraciflua* 'Andrew Hewson' należy sadzić na osłoniętym, słonecznym stanowisku, na glebie o umiarkowanej zawartości składników odżywczych i odczynie od kwaśnego do obojętnego.

TYP NASADZENIA

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa o pokroju naturalnym, drzewa dające cień

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: ulica, aleja, plac, parking, park, pas zieleni, pojemniki, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny

CECHY

Kształt korony: szeroko-jajowata, wąskopiramidalna | **Struktura korony:** półtwarda | **Wysokość:** 15 - 20 m | **Szerokość:** 8 - 12 m | **Strefa mrozoodporności:** 5B - 10B

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użytkowania:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: kłosa, główki, niepozorne | **Kolor kwiatów:** żółtozielony | **Termin kwitnienia:** kwiecień - maj | **Kolor liści:** pączki brązowe, ciemnozielony | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, pachnące, głęboko powcinane (dissectum), karbowane, wrębne | **Kolor jesienią:** pomarańczowoczerwony, szkarłatny, czerwono-fioletowy | **Owoce:** nieliczne owoce, małe, torebka, kolczaste orzechy | **Kolor owoców:** brązowy | **Kolor kory:** szary | **Kora:** bruzdowana | **Kolor pędów:** czerwono-brązowy | **Pędy:** korkowate | **System korzeniowy:** głęboki, rozległy, mięsiste korzenie, korzeń główny