

Liquidambar styraciflua Variegata Group



W 2004 roku w roczniku Międzynarodowego Towarzystwa Dendrologicznego zaproponowano, aby odtąd stosować zbiorczą nazwę *Liquidambar styraciflua* Variegata Group dla odmian ambrowców amerykańskich znanych dotychczas pod nazwami 'Aura', 'Aureum' i 'Variegata'. Są to drzewa wolno rosnące, ale ostatecznie mogą osiągnąć wysokość do piętnastu metrów. Ambrowce amerykańskie przypisane do grupy *Liquidambar styraciflua* Variegata Group mają wyprostowany pień główny z wąską, jajowatą koroną o szerokości około czterech metrów.

Liquidambar styraciflua Variegata Group wytwarza niepozorne, żółtozielone kłosa kwiatowe pod koniec kwietnia lub na początku maja. Odmiana ta nie wytwarza wielu owoców, ale za to małe, kolczaste, brązowozielone orzeszki, które pojawiają się po okresie kwitnienia i są bardzo efektowne. Poszczególne odmiany ambrowca amerykańskiego rozróżniano dawniej na podstawie minimalnych różnic w wielkości liści, różnic w występowaniu plamek, a także zróżnicowania kolorystycznego (młodocianych) jesiennych liści. Powszechnie znane, dłoniaste, 5-kłapowe liście *Liquidambar styraciflua* Variegata Group są z początku żółtawe i po części różowe i kolorowe, a latem pojawiają się na nich białozółte cętki i plamki. Jesienne wybarwienie jest raczej stonowane jak na ambrowce, a jego odcienie wahają się od żółtawych do bladoróżowoczerwonych. Pędy i gałęzie nie mają charakterystycznych dla ambrowców korkowatych szczelin.

Odmiany *Liquidambar styraciflua* Variegata Group doskonale sprawdzą się przy ulicy czy alei. Natomiast w parkach i ogrodach drzewa te ożywiają teren swoimi charakterystycznymi liśćmi, które pięknie wzbogacają otoczenie. Ze względu na możliwość wystąpienia poparzeń słonecznych na liściach ambrowce te nie mogą być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Źle znoszą też wiatr, ponieważ ich gałęzie są kruche i łamliwe. Odmiana *Liquidambar styraciflua* Variegata Group lubi miejsca jasne i osłonięte, na glebie o umiarkowanej zawartości składników odżywczych, bogatej w składniki odżywcze, o odczynie kwaśnym do obojętnego.

TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa o pokroju naturalnym, drzewa dające cień

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: ulica, aleja, park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny

CECHY

Kształt korony: wąskojajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 7 - 15 m | **Szerokość:** 4 - 5 m | **Strefa mrozoodporności:** 5B - 10B

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: kłosa, główki, niepozorne | **Kolor kwiatów:** żółtozielony | **Termin kwitnienia:** kwiecień - maj | **Kolor liści:** żółty pstre, pączki żółte, pączki różowe, liście pstre | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, pachnące, strzępiaste, karbowane, wrębne | **Kolor jesienią:** bladżółty, czerwony, różowy | **Owoce:** efektowne, małe, torebka, kolczaste orzechy | **Kolor owoców:** brązowozielony | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** bruzdowana | **Kolor pędów:** brązowozielony | **Pędy:** nagie, z przetchlinkami | **System korzeniowy:** głęboki, rozległy, mięsiste korzenie, korzeń główny