

Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

robinia biała odm. Bessoniana



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa charakterystyczne | **Topiary na pniu:** kandelabra

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: ulica, aleja, plac, parking, park, pas zieleni, pojemniki, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia miejskie

CECHY

Kształt korony: szerokojajowata, szerokojajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 15 - 20 m | **Szerokość:** 10 - 15 m | **Strefa mrozoodporności:** 5A - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** uboga w składniki odżywcze, średnio zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 5, wartość pyłku 5 | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zasolenie, tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza, tolerancja na wysoką temperaturę

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, motylkowe, zwisające, małe, zapach kwiatowy | **Kolor kwiatów:** kremowobiały | **Termin kwitnienia:** czerwiec - czerwiec | **Kolor liści:** zielony, pączki jaskrawozielone | **Liście:** opadające zimą, owalne, jajowate, pierzaste, wiązanie azotu | **Kolor jesienią:** żółty | **Owoce:** sporadycznie owocuje, trujące, strąk | **Kolor owoców:** czerwono-brązowy | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** głęboko bruzdowana | **Kolor pędów:** brązowy, oliwkowozielony | **Pędy:** prawie bezcierniste | **System korzeniowy:** płytki, rozległy