

Stewartia rostrata stewarcja dzióbkowata



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: krzewy soliterowe

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, duży ogród, mały ogród, cmentarz | Chodnik: brak

CECHY

Kształt korony: szerokopiramidalna | Struktura korony: otwarta | Wysokość: 3 - 8 m | Szerokość: 2 - 5 m | Strefa mrozoodporności: 6B - 11A

WYMAGANIA


Wiatr: nieodporne na wiatr | Gleba: less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, gleba piaszczysta, gleba ilasta | Stopień użyczenia: zasobna w składniki odżywcze | Poziom nawodnienia gleby: wilgotna | Stanowisko: półcieniste | Odczyn gleby: kwaśny | Rośliny pożyteczne: pszczoły | Ekstremalne warunki: osobliwość

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: efektowne, pojedyncze, małe, delikatnie pachnące | Kolor kwiatów: biały, żółcistożółty | Termin kwitnienia: maj - czerwiec | Kolor liści: czerwonozielony | Liście: opadające zimą, jajowate, piłkowane | Kolor jesienią: szkarłatny | Owoce: efektowne, małe, torebka | Kolor owoców: czerwony | Kolor kory: czerwony | Kora: gładka później chropowata | Kolor pędów: czerwono-brązowy | Pędy: nagie | System korzeniowy: płytki, słabo rozgałęziony



EBBEN
trees since 1862



TreeEbb